

# Trockenvitamin-Konzentrat

Pienso complementario dietético

Soluble en agua

Para apoyar la preparación para del celo y la reproducción

Especies de destino: cerdos, aves de corral y ruminantes

## Características nutritivas esenciales

Altos niveles de vitaminas A y D

**Composición:** Lactosa, Cloruro de sodio

## Componentes analíticos

Proteína bruta: 3,6 %; Grasa bruta: 0,2 %;

Fibra bruta: 0,0 %; Ceniza bruta: 6,5 %; Lisina: 0,0 %; Metionina: 0,0 %; Sodio: 2,0 %

## Contenido de aditivos por kg

**Vitaminas:**

Vitamina A (3a672a): 1.000.000 U.I.; Vitamina D<sub>3</sub> (3a671): 200.000 U.I.;

Vitamina E (acetato de α-tocoferol) (3a700): 5.250 mg; Vitamina B<sub>1</sub> (3a820): 1.500 mg;

Vitamina B<sub>2</sub> (3a825ii): 3.750 mg; Vitamina B<sub>6</sub> (piridoxina)(3a831): 2.000 mg;

Vitamina B<sub>12</sub>: 7.500 µg; Vitamina K<sub>3</sub> (3a711): 1.750 mg; Vitamina C (3a300): 50.000 mg;

Nicotinamida (3a315): 18.000 mg; Pantotenato de calcio (3a841): 6.500 mg;

Ácido fólico (3a316): 400 mg

## Período de utilización recomendado

*Vacas:* 2 semanas antes del final de la gestación hasta la confirmación del siguiente gestación

*Cerdas:* 7 días antes a 3 días después del parto y 7 días antes a 3 días después del apareamiento

*Otros mamíferos hembras:* desde la última fase de la gestación hasta la confirmación del siguiente gestación

*Aves de corral hembra:* durante el celo

*Machos:* durante los períodos de actividad reproductiva

## Recomendaciones de uso

Para requisitos especiales de rendimiento, así como en las fases de estrés como apoyo a la vacunación y para la vitalización general y la convalecencia.

## Indicaciones para la alimentación

El pienso complementario dietético puede contener vitamina A y vitamina D en concentraciones superiores a cien veces el nivel máximo fijado correspondiente en los piensos completos.

Este pienso complementario sólo puede administrarse a animales reproductores hasta un 1 % de la ración diaria debido al mayor contenido de Vit A en comparación con los piensos completos. No se permite el uso simultáneo de la vitamina D<sub>2</sub>. Deberá consultarse a un experto en alimentación animal o a un veterinario antes de utilizar el pienso o de prolongar su período de utilización.

**Recomendaciones para la administración:** 5 g por cada litro de agua de beber.

**Indicación de peligro:** H412 Nocivo para los organismos acuática con efectos nocivos duraderos.

## Aviso de seguridad

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P501 Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / internacionales.

## Conservación

La garantía de estabilidad tiene validez sólo para envases cerrados y almacenados en sitios frescos y secos.

