

Lidocainhydrochlorid 2 %

Forma farmacéutica: 20 mg/ml, solución inyectable

Principio activo: hidrocloreuro de lidocaina

Especies de destino: caballos, perros y gatos

Titular de la autorización de comercialización y fabricante:

bela-pharm GmbH & Co. KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta
Alemania



Denominación del medicamento veterinario:

Lidocainhydrochlorid 2 %
20 mg/ml, solución inyectable para caballos, perros y gatos
Principio activo: hidrocloreuro de lidocaina

Composición:

1 ml de solución contiene:

Principio activo:

Hidrocloreuro de lidocaina 20,0 mg

Adyuvantes:

Parahidroxibenzoato de metilo 1,8 mg

Parahidroxibenzoato de propilo 0,2 mg

Edetato de sodio 10,0 mg

Solución inyectable clara e incolora.

Tamaño del envase: 100 ml

Indicaciones:

Caballo, perro, gato:

Anestesia de infiltración e anestesia regional de conducción en operaciones e otras intervenciones quirúrgicas e tratamiento de los dientes. Anestesia superficial de las mucosas.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad frente a anestésicos locales del tipo de amida.
Aparición de proceso infeccioso de los tejidos en la zona de aplicación.
Insuficiencia cardíaca, trastornos del ritmo cardíaco, hipercalemia, trastornos de la función del hígado, diabetes mellitus, acidosis e enfermedades neurológicas requieren un cumplimiento estricto de las indicaciones.

Efectos adversos:

En casos únicos pueden aparecer taquicardia, bradicardia, trastornos de la conducción del corazón, descenso de la presión sanguínea e reacciones alérgicas.

Especies de destino: Caballos, perros e gatos

Posología para cada especie, modo e vías de administración:

Lidocainhydrochlorid 2 % se inyecta por vía subcutánea, intramuscular o perineural o se aplica en la mucosa.

Lidocainhydrochlorid 2 %

La cantidad necesaria varia en dependencia de la indicación (fin, modo y lugar de la aplicación, tamaño y estado general del paciente).

Dosificación:

Anestesia de infiltración de la piel y subcutis:

1 ml de Lidocainhydrochlorid 2 % por cm de corte cutáneo

La dosis total no debe exceder 2 - 4 mg de lidocaína por kg de peso corporal (1 ml de Lidocainhydrochlorid 2 % por 5 - 10 kg de peso corporal).

Instrucciones para una correcta administración:

Advertencias especiales:

Lidocainhydrochlorid 2 % se inyecta por vía subcutánea, intramuscular o perineural o se aplica en la mucosa. Se debe evitar una inyección intravascular debido a una aspiración previa.

Precauciones especiales:

Precauciones especiales para su uso en animales:

El tipo previsto de inyección y dosificación se debe seguir estrictamente, ya que sobredosificaciones e inyecciones intravasculares pueden causar efectos centrales y cardíacos (vómitos, estados de excitación, temblores musculares hasta espasmos clónicos, depresión respiratoria y paro cardíaco).

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales:

No se indican.

Uso durante la gestación, la lactancia o la puesta

Cumplimiento estricto de las indicaciones. Lidocaína atraviesa la barrera placentaria y es excretada en animales lactantes con la leche.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

El efecto de la anestesia local va a ser alargado mediante la aplicación concomitante de cuerpos bloqueadores (por ejemplo epinefrina). Analgésicos similares a la morfina reducen la tasa de metabolización de lidocaína.

Sobredosificación

Sobredosificaciones e inyecciones intravasculares mostrarsen en temblores, intranquilidad, ataxia, estados de angustia o excitación, temblores musculares hasta espasmos clónicos, depresión de la tensión arterial, bradicardia, inconsciencia, parálisis respiratoria y paro cardíaco.

En el caso de una intoxicación el tratamiento de las síntomas centrales es de máxima urgencia. En caso de espasmos tratar con benzodiazepinas o barbitúricos de eficacia corta. Si es necesario medidas para el mantenimiento de la respiración. En caso de un descenso fuerte de la presión sanguínea sustitución volumétrica (terapia de shock) y vasopresores.

Incompatibilidades:

Debe evitarse la mezcla con otros medicamentos debido a posibles incompatibilidades.

Tiempos de espera:

Caballo:	tejidos comestibles:	8 días
	Leche:	5 días

Lidocainhydrochlorid 2 %

Precauciones especiales de conservación:

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

Período de validez después de abierto el recipiente: 28 días

Los residuos del medicamento en el envase al final de este período deben ser eliminados.

Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso:

Los productos no usados o los envases con remanentes deben ser preferentemente llevados a los puntos de recogida de contaminantes. Cuando se eliminen junto con los residuos domésticos, hay que garantizar que no haya acceso a los mismos. Los productos farmacéuticos veterinarios no deben ser arrojados a las aguas residuales o a las redes de canalización. Deben observarse y respetarse las regulaciones locales para la eliminación de productos farmacéuticos.

Número de autorización de comercialización:

6357796.00.00 (Alemania)

Únicamente para uso veterinario.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Fecha de la revisión del texto: 30.06.2016