

# Vitamin E + Selen

**100 mg/ml / 2 mg/ml, emulsión para inyección**  
para caballos, bovinos, cerdos, ovinos, cabras, perros y gatos

## Titular de la autorización de comercialización y fabricante:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG  
Lohner Straße 19  
D-49377 Vechta/ Alemania

## Denominación del medicamento veterinario:

Vitamin E + Selen  
100 mg/ml / 2 mg/ml, emulsión para inyección para caballos, bovinos, cerdos, ovinos, cabras, perros y gatos.

## Composición:

1 ml emulsión para inyección contiene:  
Todo-rac-acetato de  $\alpha$ -tocopherilo 100,00 mg  
Selenito de sodio 2,00 mg  
Alcohol benzílico 20,00 mg

Emulsión de color turbio a blanco lechoso / amarillento.

## Indicaciones:

*Caballo, bovino, cerdo, oveja, cabra, perro y gato.*

Para la terapia de enfermedades por deficiencia de vitamina E y para la sustitución a mayores exigencias, especialmente: distrofia muscular, miopatía y enfermedad cardíaca de mora. Un tratamiento con Vitamina E + Selen pro iniectione solo promete en la etapa temprana de la enfermedad o para la profilaxis.

## Contraindicaciones:

No utilizar en casos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a cualquiera de los excipientes.

## Efectos adversos:

Los cerdos de engorde que pesan entre 60 y 90 kg pueden mostrar baja tolerancia. En bovinos y caballos pueden ocurrir reacciones sistémicas hasta shock anafiláctico y muerte. Después de la inyección intramuscular, se pueden observar reacciones graves en el sitio de la inyección.

## Especies de destino:

*Caballos, bovinos, cerdos, ovinos, cabras, perros y gatos.*



# Vitamin E + Selen

## Posología para cada especie, modo y vías de administración:

Para inyección subcutánea única:

<i>Caballo y bovino:</i>	5 - 10 ml / animal
<i>Ternero:</i>	2 - 4 ml / animal
<i>Oveja, cabra:</i>	1 - 1,5 ml / animal
<i>Cerdo:</i>	3 ml / animal
<i>Lechón:</i>	2 ml / animal
<i>Perro, gato:</i>	0.5 - 1 ml / animal

## Instrucciones para una correcta administración:

No indicada.

## Tiempo de espera:

<i>Caballo:</i>	tejidos comestibles:	7 días
	leche:	0 días
<i>Bovino:</i>	tejidos comestibles:	7 días
	leche:	0 días
<i>Cerdo:</i>	tejidos comestibles:	7 días
<i>Oveja, cabra:</i>	tejidos comestibles:	7 días
	leche:	0 días

## Precauciones especiales de conservación:

Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C).

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Período de validez después de abierto el envase: 28 días

## Advertencias especiales:

Advertencias especiales para cada especie de destino:

Ninguna.

## Precauciones especiales:

*Precauciones especiales para su uso en animales:*

El medicamento veterinario Vitamin E + Selenium no se puede usar en recién nacidos durante la primera semana de vida debido a su contenido de alcohol bencílico.

No administre más de la dosis recomendada. En los gatos, debido al riesgo de daño hepático, se debe garantizar que la dosis administrada no alcance o exceda los 10 mg de alcohol bencílico / kg de peso corporal.

*Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales:*

Lávese las manos después de usar.

Acetato de  $\alpha$ -tocopherilo y selenito de sodio pueden causar sensibilización.

Las personas con hipersensibilidad conocida a acetato de  $\alpha$ -tocopherilo y selenito de sodio deben evitar el contacto con el medicamento veterinario.

Si desarrolla síntomas como una erupción después de una exposición accidental, busque atención médica y muéstrele esta advertencia al médico. La hinchazón de la cara, los labios o los párpados o la dificultad para respirar son graves y requieren atención médica urgente.

# Vitamin E + Selen

El medicamento veterinario puede ser irritante para la piel. El contacto con la piel debe evitarse. En caso de contacto accidental, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón. El medicamento veterinario puede irritar los ojos. El contacto con los ojos debe evitarse. En caso de contacto accidental, enjuague los ojos con abundante agua.

El medicamento veterinario puede causar reacciones en el sitio de la inyección. Para evitar la autoinyección accidental, el uso debe hacerse con cuidado. En caso de autoinyección accidental, busque atención médica de inmediato y muestre el prospecto o la etiqueta del envase al médico.

## Uso durante la gestación o la lactancia:

No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación o la lactancia. Úselo únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio / riesgo del veterinario responsable.

## Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No conocida.

## Sobredosificación:

Debido a un potencial tóxico relativamente alto de selenio, las dosis recomendadas deben observarse estrictamente. Los síntomas de una sobredosis aguda son inespecíficos, como inapetencia, salivación y náuseas.

En la toxicosis por selenio crónico pueden observarse alopecia, pezuñas y deformaciones en las uñas con desprendimiento parcial de la pared del casco y daño en el cartílago articular. En tales casos, la aplicación de preparaciones que contienen selenio debe detenerse inmediatamente.

## Incompatibilidades:

No conocida.

## **Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso:**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

## **Fecha en que fue aprobado el prospecto por última vez:**

11.11.2020

## **Información adicional:**

1 x 100 ml

6 x 100 ml

12 x 100 ml

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

**Número de autorización de comercialización:** 402288.00.00 (Alemania)

**Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

**Únicamente para uso veterinario.**