

# Isotonic sodium chloride solution

**Forma farmacéutica:** solución para infusión

Ingrediente activo: cloruro de sodio

Especies de destino:

equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros y gatos

**Composición:**

1.0 ml de solución para infusión contiene:

Sustancia farmacológicamente activa:

Cloruro de sodio 9.0 mg

**Forma farmacéutica:** solución para infusión

**Tamaño del envase:** 750 ml

**Especies de destino:** equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros y gatos.

**Indicaciones para el uso:**

Ante deshidratación hipotónica e isotónica, reemplazo de fluidos plasmáticos isotónicos debido a pérdida de líquidos extracelulares. Como expansor a corto plazo del volumen plasmático intravascular. Para tratar heridas y humeder vendajes. Como solución transportadora de fármacos compatibles con la solución isotónica de cloruro de sodio.

**Dosificación y método de administración:**

Para infusiones intravenosas, inyecciones subcutáneas e intraperitoneales y para uso externo.

Equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, perros y gatos:

La infusión debe aplicarse lo más lentamente posible, 15-20 ml/ kg de peso corporal/ hora.

En casos urgentes se debe acelerar la tasa de infusión.

La cantidad a administrar debe estar ajustada a las demandas de fluidos.

**Comentarios:**

Debe controlarse el balance de agua, así como también, el iodo presente en la sangre, Debe utilizarse con cuidado ante hipopotasemia e hiponatremia.

**Contraindicaciones:**

Ante hipernatremia, hiperhidratación.

**Reacciones adversas:**

No se conocen siempre que se observen las recomendaciones y las contraindicaciones.

**Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:**

Si se pretende mezclar con otros fármacos debe tenerse que pueden formarse precipitados.

**Tiempo de espera:**

Bovinos, ovinos, caprinos y equinos:

Carne: 0 días

Leche: 0 días

Porcinos: Carne: 0 días



# Isotonic sodium chloride solution

## **Precauciones especiales para el almacenamiento:**

Almacenar a temperatura ambiente (<25°C).

Debe mantenerse alejado del alcance de los niños.

No usar posterior a la fecha de vencimiento.

Este medicamento debe ser utilizado inmediatamente después de abierto el envase. Las cantidades remanentes deben ser eliminadas.

Utilizar solo soluciones transparentes en envases originales sellados.

**Solo para uso animal.**

**Solo bajo prescripción veterinaria!**

**Fecha de revisión del texto:** Septiembre de 2009