

# Paraquine®: Problem „gelöst“!\*

\*In bewährter Qualität als Arzneimittelzulassung



Die Lösung in:  
5 & 10 Liter

**Paraquine® 1 ml/ml**  
Flüssigkeit zum Eingeben für  
Pferde, Hunde und Katzen

[www.bela-pharm.com](http://www.bela-pharm.com)

**bela-pharm**  
Arzneimittelfabrik

# Paraquine® 1 ml/ml



**Hinweis:** Unvollständige Kurzfassung. Eine detaillierte Produktinformation erhalten Sie auf unserer Homepage [www.bela-pharm.com](http://www.bela-pharm.com) oder bei Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter.

## Flüssigkeit zum Eingeben (oral/rektal) für Pferde, Hunde und Katzen Dünnflüssiges Paraffin

### BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Paraquine® 1 ml/ml, Flüssigkeit zum Eingeben für Pferde, Hunde und Katzen

### WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält Wirkstoff: dunnflüssiges Paraffin 1 ml

### ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Behandlung von Obstipationen beim Pferd (insbesondere bei Koliken), zur Behandlung von Obstipationen bei Hunden und Katzen.

### GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei Ileus und Erbrechen.

### NEBENWIRKUNGEN

Nach Aspiration des Tierarzneimittels kann eine Lipidpneumonie entstehen. Nach langfristiger Anwendung des Tierarzneimittels kann es zu einer Absorption über das Lymphsystem und der Bildung von granulomatösen Läsionen der Darmwand und ggf. der Leber kommen. Die längere Einnahme kann zu einer verminderten Absorption von fettlöslichen Vitaminen und ggf. auch von anderen Nährstoffen führen. Paraffinaustritt durch den Anus kann von Hunden und Katzen als störend empfunden werden und sehr selten zu Wundheilungsstörungen im anorektalen Bereich führen. Langzeitanwendung kann zu einer reduzierten Stimulation der Darmschleimhaut führen und dadurch eine Verstopfung verursachen.

### DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Pferde:

1. Tag	2–3 mal täglich 1 Liter Paraffin, orale Anwendung
2. und 3. Tag	je 1 Liter, orale oder ggf. rektale Anwendung

Hunde:

5–30 ml mehrmals täglich orale oder ggf. rektale Verabreichung

Katzen:

2–5 ml mehrmals täglich orale oder ggf. rektale Verabreichung

### WARTEZEITEN

Pferd: Essbare Gewebe: 0 Tage.

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

### BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Im Behältnis verbleibende Restmengen des Tierarzneimittels sind nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nach Anbruch zu verwerfen.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 3 Monate.

### BESONDERE WARNHINWEISE

Keine. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

### ZULASSUNGSINHABER

Bela-Pharm GmbH & Co. KG  
Lohner Straße 19, D-49377 Vechta

**Zul.-Nr.: V7002859.00.00**

**Stand: 24.06.2021**

**Für Tiere**

**Apothekenpflichtig**