

Rehydrat® Tabs

agilan® pienso complementario

Para favorecer la digestión
fácilmente soluble, efervescente, rico en energía y electrolitos

Para terneros, lechones y aves de corral

Composición

Lactosa; Bicarbonato de sodio; Cloruro de sodio; Cloruro de potasio

Componentes analíticos

Proteína bruta	5,5 %
Grasa bruta	1,8 %
Fibra bruta	0,5 %
Ceniza bruta	17,9 %
Sodio	6,5 %
Potasio	1,2 %
Cloruro	4,3 %
Lisina	0,0 %
Metionina	0,0 %

Contenido de aditivos por kg

<u>Conservantes:</u>	ácido cítrico (E330)	80.000 mg
<u>Vitaminas:</u>	Vitamina C (3a300)	10.000 mg

Recomendaciones de empleo

Para la rehidratación oral en *terneros, lechones y aves*.

Rehydrat® Tabs compensa de forma rápida y fiable las pérdidas de electrolitos y de agua corporal gracias a una composición mineral adecuada y a la deficiencia energética debida a la lactosa rica en energía.

Recomendación para la alimentación

Terneros: 1 pastilla efervescente / litro de agua tibia

debe ofrecerse además de las comidas lácteas habituales como 1-3 comidas intermedias al día en una cantidad diaria correspondiente a la gravedad de los casos para ingesta independiente. La solución de Rehydrat® debe utilizarse durante toda la duración de una consistencia fecal alterada.

Consistencia de las heces	Necesidades adicionales de fluidos (en % de peso corporal)	40 kg ternero	
		por día	bebederos por día
Delgada y blanda	aprox. 5%	2 l	2 l / 1 x al día
Caldoso	aprox. 10%	4 l	2 l / 2 x al día
Acuosa	15 (-20)%	6 (-8 l)	2 l / 3 x al día

Lechones: 1 pastilla efervescente / litro de agua tibia

La solución Rehydrat® se ofrece a los lechones para que la consuman libremente. De preferencia prepare la solución fresca varias veces al día. Esto mantendrá la curiosidad de los lechones y evita la absorción de olores del entorno.

Aves de corral: disolver 1 pastilla efervescente / 100 litros de agua potable.



Rehydrat[®] Tabs

Indicaciones para la alimentación

La solución debe estar recién preparada con agua limpia antes de cada uso.

Rehydrat[®] pastillas efervescente debe darse en un intervalo de tiempo de la ración de leche entera / sustituto de leche.

La lactosa proporciona a Rehydrat[®] pastillas efervescentes una densidad energética muy alta con una baja osmolaridad.

La lactosa mantiene la actividad de la lactasa, por lo que es posible volver a la alimentación con leche sin problemas.

Este producto no está pensado como único bebedero para terneros y lechones.

Tiempo de alimentación recomendado: 1 - 7 días

En caso de peligro antes, durante o después de los trastornos digestivos.

Se recomienda consultar un veterinario antes de utilizarlo o antes de extender el período de alimentación.

Conservación

La garantía de estabilidad tiene validez sólo para envases cerrados y almacenados en sitios fresco y secos.

¡Mantenga alejados de niños!

Estado: febrero de 2019