

# Multi-Vitamin-Konzentrat

agilan® Diätergänzungsfuttermittel

Futtermischbar

zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung

Zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion bei Schweinen, Geflügel und Wiederkäuern

## Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale

Hoher Gehalt an Vitamin A und D

## Zusammensetzung

Weizengrießkleie

Natriumchlorid

## Analytische Bestandteile

Rohprotein	13,6 %
Rohöl und -fette	3,9 %
Rohfaser	10,0 %
Rohasche	10,1 %
Lysin	0,6 %
Methionin	0,2 %
Natrium	2,0 %

## Empfohlene Fütterungsdauer

**Kühe:** Zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit.

**Sauen:** 7 Tage vor bis drei Tage nach der Geburt und

7 Tage vor bis drei Tage nach der Paarung

**Sonstige weibliche Säugetiere:** ab der letzten Phase der Trächtigkeit bis zur bestätigten nächsten Trächtigkeit

**Weibliches Geflügel:** während des Östrus

**Männliche Tiere:** während der Reproduktionsaktivität

## Einsatzempfehlung

Bei besonderen Leistungsanforderungen sowie in Belastungsphasen als Impfbegleitung und zur allgemeinen Vitalisierung und Rekonvaleszenz.

## Fütterungshinweis

Das Diätergänzungsfuttermittel darf Vitamin A und Vitamin D in Konzentrationen von mehr als dem Einhundertfachen des entsprechenden festgelegten Höchstgehalts in Alleinfuttermitteln enthalten.

Dieses Diätergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehalte an Vitamin A an Zuchttiere nur bis 0,45% der Tagesration verfüttert werden.

Die gleichzeitige Verabreichung von Vitamin D<sub>2</sub> ist unzulässig.

**Vor Verwendung des Futtermittels oder vor Verlängerung seiner Verwendungsdauer ist der Rat eines Fütterungsexperten oder Tierarztes einzuholen.**



# Multi-Vitamin-Konzentrat

## Gehalt an Zusatzstoffen je kg

*Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung:*

Vitamin A (3a672a)	2.000.000 I.E.
Vitamin D <sub>3</sub> (3a671)	200.000 I.E.
Vitamin E (all rac- $\alpha$ -Tocopherylacetat) (3a700)	5.250 mg
Vitamin B <sub>1</sub> (3a820)	1.500 mg
Vitamin B <sub>2</sub> (3a825i)	3.760 mg
Vitamin B <sub>6</sub> / Pyridoxinhydrochlorid (3a831)	2.000 mg
Vitamin B <sub>12</sub> / Cyanocobalamin	7.500 $\mu$ g
Vitamin K <sub>3</sub> (3a711)	788 mg
Vitamin C (3a300)	50.000 mg
Niacinamid (3a315)	18.000 mg
Ca-D-Pantothenat (3a841)	6.500 mg
Folsäure (3a316)	400 mg

## Fütterungsempfehlung

4,5 g / kg Futter

## Lagerung

Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühler und trockener Lagerung.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Stand: November 2019