

CORLI

veraphen® Bio-Produkte

Ergänzungsfuttermittel

Für Geflügel

Zusammensetzung

Natriumchlorid, Magnesiumchlorid

Analytische Bestandteile

| | | | |
|------------------|-------|-----------|--------|
| Rohprotein | < 1 % | Lysin | 0,0 % |
| Rohfaser | < 1 % | Methionin | 0,0 % |
| Rohöle u. -fette | < 1 % | Natrium | 0,02 % |
| Rohasche | < 1 % | | |

Gehalt an Zusatzstoffen je l

Natürliche Aromastoffe, deren Zusatz zu Futtermitteln deren Geruch oder Schmackhaftigkeit verbessert:

Wässrige Mischung aus natürlichen Aromastoffen: 138.000 mg

Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung:

Vitamin C (3a300): 750 mg

Fütterungsempfehlung

Anwendung im Trinkwasser!

Vor Gebrauch schütteln!

· *Broiler:*

Bei Auftreten von Symptomen:

Vor dem 10. Lebenstag: 1000 ml/1000 l über 4–5 Tage

Nach dem 10. Lebenstag: 1000–1500 ml/1000 l über 4–5 Tage

Wiederholen Sie die Behandlung bei Bedarf.

· *Puten:*

Bei Auftreten von Symptomen:

1000–1200 ml/1000 l über mindestens 5 Tage

Nicht vor dem 50. Lebenstag anwenden.

Einsatzempfehlung

Bei ernährungsbedingten Störungen der Mobilität in starken Wachstumsperioden.

Lagerung

Das Produkt in seiner Originalverpackung bei normalen Temperaturverhältnissen und gegen elektromagnetische Quellen geschützt einlagern.

Das Produkt kann, entsprechend den gültigen Vorschriften bzw. Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und VO (EG) 889/2008, im biologischen Anbau eingesetzt werden.

Das Produkt ist FR-BIO-01 zertifiziert.

Kontrollstelle mepro: DE-ÖKO-006

Stand: Mai 2018

6030/K/05/18

