

# Agivit E + Selen flüssig

## agilan® Diätergänzungsfuttermittel

Zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung  
Zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion  
bei Schweinen, Geflügel und Wiederkäuern  
Hoher Gehalt an Selen und Vitamin E

### Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale

Hoher Selengehalt und Mindestgehalt an Vitamin E je kg Alleinfuttermittel mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 % von 50 mg für Schweine, 40 mg für Geflügel oder einem Mindestgehalt an Vitamin E je Tier und Tag von 100 mg für Schafe und 300 mg für Rinder.

### Zusammensetzung

Traubenzucker, Natriumchlorid

### Analytische Bestandteile / l

Rohprotein	0,10%
Rohfaser	0,10%
Rohfett	13,60%
Rohasche	0,25%
Natrium	0,04%
Lysin	0,00%
Methionin	0,00%
Feuchtigkeit	59,10%

### Empfohlene Fütterungsdauer

- *Kühe:*  
zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit.
- *Sauen:*  
sieben Tage vor bis drei Tage nach der Geburt und sieben Tage vor bis drei Tage nach der Paarung.
- *Weibliches Geflügel:*  
während des Östrus.
- *Männliche Tiere:*  
während der Reproduktionsaktivität.

### Einsatzempfehlung

Bei besonderen Leistungsanforderungen sowie in Belastungsphasen, als Impfbegleitung und zur allgemeinen Vitalisierung.

### Gehalt an Zusatzstoffen je L

#### Vitamine:

Vitamin E aus all rac-alpha-Tocopheryllacetat (3a700) 150.140 mg

#### Spurenelemente:

Selen aus Natriumselenit (3b801) 92,1 mg

#### Antioxidationsmittel:

Butylhydroxytoluol (BHT) (E321) 98 mg



# Agivit E + Selen flüssig

## Fütterungsempfehlung

*Geflügel, Schweine:* 500-1000 ml auf 1.000L

*Rinder:* 5-10 ml/100 kg KG/Tag

Mindestens über drei Tage verfüttern.

## Fütterungshinweis

Das Diätergänzungsfuttermittel darf Selen in Konzentrationen von mehr als dem Einhundertfachen des entsprechenden festgelegten Höchstgehalts in Alleinfuttermitteln enthalten. Dieses Diätergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehalte an Selen nur bis 0,5% der Tagesration verfüttert werden.

**Vor Verwendung des Futtermittels oder vor Verlängerung seiner Verwendungsdauer ist der Rat eines Fütterungsexperten oder Tierarztes einzuholen.**

## Lagerung

Halbbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühler und trockener Lagerung.

Stand: November 2020