

Amoxi-Sleecol® 800 mg

Tabletten zur intrauterinen Anwendung

für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers und, wenn unterschiedlich des Herstellers, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist

Albrecht GmbH
Hauptstraße 6 – 8; 88326 Aulendorf
Mitvertrieb:
bela-pharm GmbH & Co. KG
Lohner Straße 19; D-49377 Vechta

Verschreibungspflichtig!
Zul.-Nr.: 6248556.00.00



Bezeichnung des Tierarzneimittels

Amoxi-Sleecol® 800 mg Tabletten zur intrauterinen Anwendung
für *Pferde, Rinder, Schweine, Schafe*
Amoxicillin-Trihydrat

Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile

1 Tablette enthält:

Wirkstoff(e):

Amoxicillin-Trihydrat 800 mg
(entspr. 696,8 mg Amoxicillin)

Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist:

Mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Magnesiumstearat, hochdisperses Siliciumdioxid

Weiß bis gelblich-weiße, längliche Tablette mit einseitiger Bruchrille.

Die Tablette kann in zwei gleiche Hälften geteilt werden.

Anwendungsgebiet(e)

Zur Behandlung von folgenden durch grampositive und/oder gramnegative Amoxicillin-empfindliche Keime hervorgerufene Krankheiten:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf: Infektionen des Endometriums
Nachgeburtsverhaltung

Gegenanzeigen

Behandlung von gegen Penicilline und Cephalosporine überempfindlichen Tieren.

Schwere Nierenfunktionsstörungen mit Anurie und Oligurie.

Vorliegen von β -Lactamase-bildenden Erregern.

Nebenwirkungen

Der Gebrauch von Penicillinen, so auch von Amoxicillin, kann allergische Reaktionen (allergische Hautreaktionen, Anaphylaxie) auslösen.

Nach Auftreten einer allergischen Reaktion darf keine Wiederholung der Behandlung mit Amoxi-Sleecol® 800 mg erfolgen, und die unter dem Passus „Hinweise für den Fall der Überdosierung“ genannten Gegenmaßnahmen sind zu ergreifen.



Amoxi-Sleecol® 800 mg

Zieltierart(en)

Rinder, Pferde, Schafe und Schweine

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung

Zur intrauterinen Anwendung

Pferd: 800 mg Amoxicillin-Trihydrat,
entsprechend 1 Tablette

Rind: 800 mg Amoxicillin-Trihydrat,
entsprechend 1 Tablette

Schaf und Schwein: 400 mg Amoxicillin-Trihydrat,
entsprechend ½ Tablette

Falls erforderlich, Wiederholung nach 48 Stunden.

Sollte nach 3 Behandlungstagen keine deutliche Besserung eingetreten sein, so wird die Fortsetzung der Behandlung mit Amoxicillin nur nach Sicherstellung der Erregersensitivität durch ein Antibiotogramm empfohlen; gegebenenfalls ist eine Therapieumstellung erforderlich.

Hinweise für die richtige Anwendung

Der direkte Kontakt des Arzneimittels mit der Haut oder den Schleimhäuten des Anwenders ist wegen der Gefahr einer Sensibilisierung zu vermeiden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung

Nach Überdosierungen können sowohl allergische Reaktionen als auch zentralnervöse Erregungserscheinungen und Krämpfe auftreten. Amoxi-Sleecol® 800 mg ist sofort abzusetzen, und es ist entsprechend symptomatisch zu behandeln.

Es ist kein spezifisches Antidot bekannt.

Bei Anaphylaxie: Adrenalin und Glukokortikoide i.v.

Bei allergischen Hautreaktionen: Antihistaminika und/oder Glukokortikoide.

Bei Krämpfen: Gabe von Barbituraten.

Wartezeit

Pferd: Essbare Gewebe: 4 Tage
Milch: 1 Tag

Rind: Essbare Gewebe: 4 Tage
Milch: 1 Tag

Schwein: Essbare Gewebe: 4 Tage

Schaf: Essbare Gewebe: 4 Tage
Milch: 1 Tag

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 30 °C lagern.

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Amoxi-Sleecol® 800 mg

Besondere Warnhinweise

Wechselwirkungen:

Hinsichtlich der antibakteriellen Wirkung besteht ein potentieller Antagonismus von Penicillinen und Chemotherapeutika mit rasch einsetzender bakteriostatischer Wirkung.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien, sofern erforderlich

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

xx.xx.2013

Weitere Angaben

Packungsgrößen:

Packung mit 10 Tabletten

Packung mit 20 Tabletten

Packung mit 50 Tabletten

Packung mit 100 Tabletten

Packung mit 200 Tabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.