

Vitamin A

agilan® Diätergänzungsfuttermittel

Futtermischbar. Zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung;
Zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion
bei Schweinen, Geflügel und Wiederkäuern

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale

Hoher Gehalt an Vitamin A

Zusammensetzung

Weizengrießkleie, Traubenzucker

Analytische Bestandteile

Rohprotein	15,70 %
Rohöl und -fette	4,60 %
Rohfaser	11,80 %
Rohasche	6,10 %
Lysin	0,70 %
Methionin	0,20 %
Natrium	0,05 %

Empfohlene Fütterungsdauer

Kühe: Zwei Wochen vor Ende der Trächtigkeit bis zur Bestätigung der nächsten Trächtigkeit .
Sauen: 7 Tage vor bis drei Tage nach der Geburt und 7 Tage vor bis drei Tage nach der Paarung
Weibliches Geflügel: während des Östrus
Männliche Tiere: während der Reproduktionsaktivität

Einsatzempfehlung

Essentiell für Wachstum und Epithelschutz.

Bei besonderen Leistungsanforderungen zur Unterstützung der körpereigenen Immunabwehr.

Gehalt an Zusatzstoffen je kg

Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung:

Vitamin A (3a672a) 10.000.000 I.E.

Fütterungsempfehlung

Schweine und Geflügel: 1 kg / t Alleinfutter

Wiederkäuer: 2-3 g je 100 kg KGW und Tag

Fütterungshinweis

Das Diätergänzungsfuttermittel darf Vitamin A in Konzentrationen von mehr als dem Einhundertfachen des entsprechenden festgelegten Höchstgehaltes in Alleinfuttermitteln enthalten. Wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln erhöhten Gehalte an Vitamin A darf dieses Diätergänzungsfuttermittel an Zuchttiere nur bis 0,1% der Tagesration verfüttert werden. **Vor Verwendung des Futtermittels oder von Verlängerung seiner Verwendungsdauer ist der Rat eines Fütterungsexperten oder Tierarztes einzuholen.** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Lagerung

Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei kühler und trockener Lagerung.

Stand: März 2017

6871/K/03/17

